

40

VYHLÁŠKA

ze dne 6. ledna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 10 a § 19 odst. 13 písm. c) a f) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „Směrnice komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.“.

2. V § 14 odst. 9 se na konci písmene l) tečka na-

hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„m) u rozmnožovacího materiálu odrůd *x Festulium*⁵⁾ (hybrid z křížení druhů rodu kostřava s druhu rodu jílek [*Festuca* spp. x *Lolium* spp.]) uvedení názvů druhů v rámci rodů *Festuca* a *Lolium*, z jejichž křížení daná odrůda pochází.

⁵⁾ Příloha č. 1 zákona.“.

3. V příloze č. 1 části IV oddílu 5 v tabulce č. 5 se u druhu bob v sloupci čtvrtém číslo „85“ nahrazuje číslem „80“.

4. V příloze č. 1 části VII oddílu 4 tabulka č. 4.3 zní:

„Požadavky na zdravotní stav porostů

Tab. 4.3

Druh	choroba	Nejvyšší dovolený výskyt (%)
řepka a řepice hořčice	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	2
slunečnice	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	3
	<i>Botrytis</i> spp.	5
konopí seté	<i>Botrytis</i> spp.	5
len	<i>Alternaria</i> spp.	3
	<i>Phoma exigua</i> var. <i>linicola</i>	3
	<i>Colletotrichum lini</i>	3
	<i>Fusarium</i> spp.	10
	<i>Botrytis</i> spp.	5
sója	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>glycinea</i>	0,2
	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i>	0,2
	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i>	
	<i>Phialophora gregata</i>	0,2
	<i>Phytophthora megasperma</i>	0,2“.

5. V příloze č. 2 tabulka Obilniny zní:

„Obilniny:

Plodina	Škodlivý organismus	Velikost vzorku	Kategorie ¹⁾	Nejvyšší povolený výskyt
Ječmen obecný	<i>Pyrenophora graminea</i>		SE, E, C	2%
	<i>Cochliobolus sativus</i>		SE, E, C	10%
	<i>Fusarium spp.</i>		SE, E, C	10%
	Hálky snětí	1000 g	SE, E, C	0 ks
	<i>Ustilago nuda</i> , <i>Ustilago hordei</i>		SE, E C	0,8% 2,0%
	<i>Claviceps purpurea</i>	1000 g	SE, E C	1 ks 3 ks
Oves setý	<i>Claviceps purpurea</i>	1000 g	SE, E C	1 ks 3 ks
Proso seté	<i>Sphacelotheca destruens</i>	300 semen	SE, E, C	10 ks
Pšenice setá Pšenice tvrdá Pšenice špalda	<i>Phaeosphaeria nodorum</i>		SE, E, C	20%
	<i>Fusarium spp.</i>		SE, E, C	10%
	<i>Ustilago tritici</i>		SE, E C	0,8% 2,0%
	<i>Tilletia spp.</i>	300 semen	SE, E, C	10 ks
	Hálky snětí	1000 g	SE, E, C	0 ks
	<i>Claviceps purpurea</i>	1000 g	SE, E C	1 ks 3 ks
Tritikale	<i>Fusarium spp.</i>		SE, E, C	10%
	<i>Tilletia spp.</i>	300 semen	SE, E, C	10 ks
	Hálky snětí	1000 g	SE, E, C	0 ks
	<i>Urocystis occulta</i>	300 semen	SE, E, C	10 ks
	<i>Claviceps purpurea</i>	1000 g	SE, E C	1 ks 3 ks
Žito seté	<i>Fusarium spp.</i>		SE, E, C	10%
	<i>Tilletia spp.</i>	300 semen	SE, E, C	10 ks
	Hálky snětí	1000 g	SE, E, C	0 ks
	<i>Urocystis occulta</i>	300 semen	SE, E, C	10 ks
	<i>Claviceps purpurea</i> ¹⁾		SE, E	1 ks
	populace	1000 g	C	3 ks
	hybridní	1000 g	SE, E C	1 ks 4 ks

¹⁾ Při pěstování žita pro farmaceutické účely se výskyt *Claviceps purpurea* nestanovuje.“.

6. V příloze č. 2 tabulka Olejniný a přadné rost-
liny zní:

„Olejniný a přadné rostliny:

Plodina	Škodlivý organismus	Velikost vzorku	Kategorie ^{*)}	Nejvyšší povolený výskyt
Hořčice bílá	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	200 g	SE, E, C	5 ks
Konopí seté	<i>Botrytis</i> spp.		SE, E, C	5%
Len	<i>Phoma exigua</i> var. <i>linicola</i>		SE, E, C	1%
	<i>Alternaria linicola</i> <i>Colletotrichum lini</i> <i>Fusarium</i> spp.		SE, E, C	5%
	<i>Botrytis</i> spp.		SE, E, C	5%
Řepice olejná	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	70 g	SE, E, C	5 ks
Řepka olejka	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	100 g	SE, E, C	10 ks
Světlice barvířská	<i>Botrytis</i> spp.		SE, E, C	5%
Slunečnice roční	<i>Botrytis</i> spp.		SE, E, C	5%
	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1000 g	SE, E, C	10 ks
Sója luštinatá	u <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>glycinea</i> nesmí být v rámci vzorku s min. 5 000 semeny na partii, rozděleného do 5 dílčích vzorků, počet dílčích vzorků napadených vyšší než 4		SE, E, C	
	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i>		SE, E, C	15%“.

7. V příloze č. 11 bod 1 zní:

„1. Nejvyšší hmotnost nebo počet kusů v jednom malém balení

Druhy	Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu (bez aditiv) v kg	Počet kusů
a) zemědělské druhy		
1. osivo řepy jednoklíčkové nebo osivo řepy pro přímý výsev	2,5	100 tis.
2. osivo řepy s výjimkou osiva uvedeného v bodě 1	10,0	
3. krmné plodiny		
- malé balení typ „A“	2,0	
(směs, která není určena pro zemědělskou výrobu)		
- malé balení typ „B“	10,0	
(malé balení základního, certifikovaného nebo obchodního osiva nebo osivo směsí s hmotností vyšší než povoluje malé balení typu „A“)		
4. brambory	10,0	
5. obilniny	10,0	
6. olejniný a přadné rostliny	10,0	

b) <u>zeleninové druhy</u>		
1. luskové zeleniny	5,0	
2. cibule, kerblík, chřest, mangold, řepa červená, tuřín, meloun vodní, tykev, cuketa, mrkev, ředkev, ředkvička, černý kořen, špenát, polníček	0,5	
3. ostatní druhy	0,1“.	

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.

Ministr:
Ing. Palas v. r.